

IMPFKALENDER

Stand: Juli 2009

Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO)

Impfstoff/ Antigen- kombination	Alter in vollendeten Monaten						Alter in vollendeten Jahren				
	Geburt	2	3	4	11-14	15-23	5-6	9-11	12-17	ab 18	≥ 60
Tetanus (T)		1.	2.	3.	4.		A	A	A ^{d) h)}		
Diphtherie (D/d)		1.	2.	3.	4.		A	A	A ^{d) h)}		
Keuchhusten Pertussis (aP/ap)		1.	2.	3.	4.		A	A	A ^{h)}		
Haemophilus influenzae Typ b (Hib)		1.	2. ^{a)}	3.	4.						
Kinderlähmung Poliomyelitis (IPV)		1.	2. ^{a)}	3.	4.			A			
Hepatitis B (HB)	1.		2. ^{a)}	3.	4.			G			
Pneumokokken		1.	2.	3.	4.						S
Meningokokken					1. ^{c)}						
Masern, Mumps, Röteln (MMR)					1.	2.					
Windpocken (Varizellen)					1.	2.		G ^{f)}			
Grippe ^{b)} (Influeza)											S
HPV ^{g)} (Humane Papillomaviren)								SM			

A Auffrischimpfung: Diese sollte möglichst nicht früher als 5 Jahre nach der vorhergehenden letzten Dosis erfolgen

G Grundimmunisierung aller noch nicht geimpften Jugendlichen bzw. Komplettierung eines unvollständigen Impfschutzes

S Standardimpfungen

SM Standardimpfungen für Mädchen

a) Bei Einzelimpfstoffen oder Impfstoffen ohne Keuchhustenanteil kann diese Dosis entfallen

b) Jährlich mit aktuellem Impfstoff

c) Ab dem vollendeten 12. Lebensmonat

d) Auffrischung alle 10 Jahre

e) Bei Verwendung eines MMR-Varizellenimpfstoffes: Gabe einer zweiten Dosis bevorzugt nach 6 Wochen (mindestens 4 Wochen)

f) Impfung von Jugendlichen ohne Windpockenerkrankung oder -impfung

g) Impfung mit drei Dosen für alle Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren

h) Alle Erwachsenen sollen mit der nächsten fälligen Impfung gegen Wundstarrkrampf (Tetanus)/Diphtherie einmalig eine Impfung gegen Keuchhusten (Pertussis) erhalten (Kombinationsimpfung)